

核准日期：2022年02月25日

【招商须知】

对接受生长激素治疗的患者进行高尿酸血症的监测，并密切监测尿酸水平，必要时给予降尿酸治疗。

【用法用量】

本品为注射剂，使用时应严格按照说明书要求进行配制，并在1.0-8.0℃冷藏条件下保存。

本品为注射剂，使用时应严格按照说明书要求进行配制，并在1.0-8.0℃冷藏条件下保存。

本品为注射剂，使用时应严格按照说明书要求进行配制，并在1.0-8.0℃冷藏条件下保存。

本品为注射剂，使用时应严格按照说明书要求进行配制，并在1.0-8.0℃冷藏条件下保存。

本品为注射剂，使用时应严格按照说明书要求进行配制，并在1.0-8.0℃冷藏条件下保存。

本品为注射剂，使用时应严格按照说明书要求进行配制，并在1.0-8.0℃冷藏条件下保存。

本品为注射剂，使用时应严格按照说明书要求进行配制，并在1.0-8.0℃冷藏条件下保存。

本品为注射剂，使用时应严格按照说明书要求进行配制，并在1.0-8.0℃冷藏条件下保存。

本品为注射剂，使用时应严格按照说明书要求进行配制，并在1.0-8.0℃冷藏条件下保存。

